

Sau đây là danh sách các kỹ năng nghe, nói và ngôn ngữ mà một em bé có khả năng thính giác bình thường có thể làm được:

Từ sơ sinh tới ba tháng tuổi...

- ♥ Giật mình khi nghe các âm thanh lớn
- ♥ Yên lặng nghe các giọng nói quen thuộc
- ♥ Quay đầu về phía quý vị khi quý vị nói

Từ ba tới sáu tháng tuổi...

- ♥ Đổi mắt theo âm thanh
- ♥ Có nhiều âm thanh khác nhau: khóc ré lên, thút thít, và/hoặc khúc khích
- ♥ Thích nghe tiếng xúc xắc và các đồ chơi tạo âm thanh

Khoảng sáu tháng tuổi...

- ♥ Quay đầu về phía có âm thanh
- ♥ Bắt đầu bắt chước các âm thanh tiếng nói
- ♥ Nói bập bẹ, “ma-ma”, “ga-ga”, “da-da”

Khoảng chín tháng tuổi...

- ♥ Quay đầu về phía có âm thanh êm dịu
- ♥ Hiểu từ “no-no” hoặc “bye-bye”
- ♥ Bắt chước âm thanh tiếng nói của những người khác

Khoảng mười hai tháng tuổi...

- ♥ Gọi đúng từ “ma-ma” hoặc “da-da”

Nếu có thắc mắc về tình trạng phát triển thính giác hoặc khả năng nói của con mình, hãy nói chuyện với chuyên gia y tế của con quý vị.



Chúng tôi có thể cung cấp ấn phẩm này dưới dạng thay thế khác như chữ nổi Braille, bản in khổ lớn và băng âm thanh. Xin liên lạc với văn phòng dưới đây để lấy tài liệu này dưới dạng khác:

MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES

Division of Community and Public Health

PO Box 570

Jefferson City, MO 65102

800-877-6246

Missouri Relay 800-735-2466

<http://www.dhss.mo.gov/NewbornHearing>

Để tìm hiểu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em khác, xin gọi số: 800-TEL-LINK (800-835-5465)

HÀNG SỞ CUNG CẤP CƠ HỘI CÔNG BẰNG/CÁM PHẢN BIỆT ĐỐI XỬ

Các dịch vụ được cung cấp công bằng mà không phân biệt đối xử.

Rev.5-07/#431

Buổi Khám Kiểm Tra Thính Giác Đầu Tiên của Con Quý Vị

Chương Trình Khám Kiểm Tra Thính Giác Cho Trẻ Sơ Sinh

Tại sao nên cho con tôi kiểm tra thính giác?

- Suy giảm thính giác là một trong những căn bệnh thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh. Tại Tiểu Bang Missouri, tất cả các em bé đều được khám kiểm tra xem có khả năng bị suy giảm thính giác hay không.
- Các em bé không thể cho chúng ta biết nếu không nghe được. Khám kiểm tra là cách duy nhất để biết em bé có bị suy giảm thính giác hay không.
- Điều quan trọng là cần phải chẩn đoán sớm các bệnh về thính giác. Hai năm đầu tiên của em bé là quan trọng nhất để em học nói và ngôn ngữ. Nếu con quý vị bị suy giảm thính giác, em sẽ không có được nhiều kinh nghiệm học tập quan trọng.

Các em bé được khám kiểm tra thính giác khi nào?

Các buổi khám kiểm tra thính giác được thực hiện tại bệnh viện chỉ trong vòng vài giờ sau khi con quý vị ra đời.

Cách thức thực hiện khám kiểm tra?

Khám kiểm tra thính giác của trẻ sơ sinh được thực hiện bằng các thiết bị đặc biệt theo một trong hai phương pháp nhanh chóng sau đây:

OAE: Otoacoustic Emissions được thực hiện bằng cách đặt các micro cực nhỏ vào khoang tai ngoài của em bé và ghi lại phản ứng của tai giữa đối với các tiếng click hoặc các âm thanh to dần.

ABR: Brainstem Auditory Evoked Response được thực hiện bằng cách đặt các điện cực lên da đầu của em bé và đo sóng não tạo ra khi phản ứng với các tiếng click.

Tôi cần biết những gì về khám kiểm tra thính giác?

- Khám kiểm tra rất an toàn, không đau và có thể xong trong khoảng 10 phút.
- Đa số các em bé đều ngủ trong khi khám kiểm tra.
- Quý vị sẽ biết kết quả khám kiểm tra trước khi rời bệnh viện.
- Kết quả sẽ là “đạt yêu cầu” hoặc “giới thiệu đi khám tiếp”.

Đừng quên cho bệnh viện biết tên của chuyên gia y tế hoặc y viện của con quý vị để gửi kết quả cho họ.



Tại sao một số em nhỏ lại cần buổi khám kiểm tra thính giác khác (“giới thiệu đi khám tiếp”)?

- Một số em bé có thể cần phải khám thêm bởi vì:
 - Có chất lỏng trong tai
 - Em bé ngủ ngáy nhiều
 - Phòng kiểm tra ồn ào
 - Em bé bị suy giảm thính giác
- Nếu con quý vị không đạt yêu cầu kiểm tra thính giác, hãy nhớ cho em đi khám kiểm tra lại hoặc đưa em tới khám với một bác sĩ chuyên khoa thính giác càng sớm càng tốt.
- Đa số các em bé cần đi khám thêm đều có thính giác bình thường. Tuy nhiên một số em sẽ bị suy giảm thính giác.

Một em bé sơ sinh có thể có kết quả khám kiểm tra thính giác đạt yêu cầu mà vẫn bị suy giảm thính giác không?

- Có, một số em bé có thính giác đủ để có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu trong lần kiểm tra đầu tiên, tuy nhiên sau đó bị suy giảm thính giác do:
 - Một số căn bệnh
 - Một số thương tích
 - Một số loại thuốc
 - Trong gia đình có người đã từng mắc bệnh suy giảm thính giác khi còn nhỏ
- Sử dụng danh sách các kỹ năng phát triển thính giác bình thường ở trang bìa sau để làm hướng dẫn. Trẻ sơ sinh và trẻ em mắc các bệnh này có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ trợ giúp.