

Requisitos de vacunación para preescolares y guarderías de Missouri para 2026

- Todos los niños deben presentar documentación sobre el estado de vacunación actualizado, que incluya el mes, el día y el año de cada vacunación antes de asistir a cuidado infantil o al centro preescolar.
- El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) permite un período de gracia de 4 días. Los niños pueden recibir las vacunas hasta cuatro días antes de la fecha límite.
- Las vacunas exigidas en Misuri deben administrarse de acuerdo con el calendario actual del ACIP, incluidos todos los intervalos ([CDC.Gov/vaccines](https://www.cdc.gov/vaccines)).
- Se permiten las exenciones para padres o tutores (Imm.P.11) y por motivos médicos (Imm.P.12). El formulario de exención correspondiente debe estar archivado. Los niños no vacunados están sujetos a la exclusión del cuidado infantil o de los centros preescolares cuando se producen brotes de enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación.
- Para permanecer en cuidado infantil o centros preescolares, los niños «en curso» deben tener archivado un formulario de vacunación en curso (Imm.P.14). En curso significa que el niño ha comenzado la serie de vacunas y tiene una cita para recibir la siguiente dosis. Se debe asistir a esta cita y se debe proporcionar un registro actualizado al centro. Si no se acude a la cita, el niño ya no estará en curso y no cumple con las normas. (p. ej., se inició la serie de vacunas contra la hepatitis B, pero el niño aún no es elegible para recibir la siguiente dosis de la serie).

| Vacunas | Dosis requerida por edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Naci-miento | 1 Mes | 2 Meses | 3 Meses | 4 Meses | 5 Meses | 6 Meses | 7 Meses | 8 Meses | 9 Meses | 10 Meses | 11 Meses | 12 Meses | 13 Meses | 14 Meses | 15 Meses | 16 Meses | 17 Meses | 18 Meses |
| DTaP/DT | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4+ |
| IPV (poliomielitis) | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+ |
| HiB | | | | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ |
| Hepatitis B | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ |
| PCV (Neumocócica) | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 4 |
| MMR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Varicela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

(+: si se vacunó a un niño siguiendo las recomendaciones del ACIP, podría recibir más dosis de las requeridas para el cuidado del niño).