


El daño cerebral por traumatismo se define como un golpe o sacudida brusca en la cabeza, o una herida penetrante en la cabeza que afecta la función del cerebro.

Un daño cerebral por traumatismo puede ocurrir por ser tacleado en el fútbol americano, por una caída, por sacudir a un bebé o a causa de una explosión en la carretera.



Cualquier persona puede sufrir un daño cerebral por traumatismo.



Missouri Department of Health and Senior Services
800-451-0669
Jefferson City, MO 65102

EMPLEADOR CON UNA POLÍTICA ACTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
Se ofrecen los servicios sin ninguna discriminación.

Se ofrece apoyo parcial por parte del Departamento de salud materno infantil (Maternal and Child Health Bureau) (Título V, Ley de seguridad social), Administración de recursos y servicios de la salud (Health Resources and Services Administration), Departamento de salud y servicios sociales (Department of Health and Human Services).

600 (06-12)

Daño cerebral **por traumatismo**

Reciba la ayuda que necesita



Departamento de Salud y Servicios
para Personas de la Tercera Edad

Los traumas cerebrales se pueden tratar...

Riesgos

- Caerse y golpearse la cabeza
- Accidentes de automóviles, bicicletas, vehículos de cuatro ruedas y motocicletas
- Agresión o abuso
- Lesiones deportivas
- Contusión
- Accidente en el lugar de trabajo
- Ser golpeado por un objeto
- Herida por bala o explosión
- Haber prestado servicios en una zona de guerra

Si a usted o a alguien que conoce le ha ocurrido algo que pudiera haber causado un daño cerebral por traumatismo, y presenta cualquiera de los siguientes síntomas asociados al daño cerebral por traumatismo, es importante que lo revise un profesional de la salud.

Síntomas (incluyen, entre otros:)

Relacionados con la salud

- Dolores de cabeza que se repiten
- Dolor en el cuello y los hombros
- Náuseas y/o mareos
- Sentirse inusualmente cansado y adormilado
- Le molestan los olores, la luz o los sonidos
- Zumbido en los oídos
- Visión borrosa o cambios en la visión
- Problemas para dormir

Emocionales o de comportamiento

- Estar irritable, preocupado, inquieto
- Estar triste o deprimido
- Quiere estar solo o lejos de las personas
- Corre riesgos sin pensar antes
- No puede comenzar tareas

Cognitivos

- Dificultad para recordar cosas
- Reacciona o piensa lentamente
- Problemas para aprender cosas nuevas
- Problemas para expresar pensamientos
- Dificultad para poner atención y resolver problemas

Los síntomas del daño cerebral por traumatismo pueden no aparecer hasta varias semanas después de que ocurre una lesión. Las personas que han sufrido un daño cerebral por traumatismo importante y los cambios relacionados con su funcionamiento pueden mostrar síntomas que se pueden confundir con los signos de trastornos de salud mental. El examen por parte de un profesional de la salud es esencial para el tratamiento correcto.

Recursos

La identificación correcta del daño cerebral por traumatismo y la intervención temprana con recursos son las claves del éxito en la rehabilitación para cualquier persona.

Para obtener más información puede ponerse en contacto con los siguientes recursos.

1. Traumatic Brain Injury (Daño cerebral por traumatismo) <http://health.mo.gov/living/healthcondiseases/tbi/index.php>
2. Brain Injury Guide and Resources (Recursos y orientación sobre daños cerebrales por traumatismo) <http://braininjuryeducation.org>
3. Brain Injury Association of Missouri (Asociación sobre daños cerebrales por traumatismo de Missouri) www.biamo.org or 800-444-6443
4. Missouri Adult Brain Injury Program (Programa de daños cerebrales por traumatismo en el adulto de Missouri) <http://health.mo.gov/living/families/shcn/ahi.php> or 800-451-0669
5. Brainline.org

